



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

25 / 23-5-18

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ- ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ- ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

1. ΑΝΑΡΣΙΑ-ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ

Οδηγίες: Άμεση επέμβαση με την λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Βερικοκιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ-7 μέρες} {Ιντοξακάρμπ-10 μέρες}, {Θιαμεθοξάμ+Χλωραντρανιλιπρόλ, Χλωραντρανιλιπρόλ -14 μέρες}.

Ροδακινιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Λάμντα Συαλοθρίν Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ- 7 μέρες }, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες }, {Αμπαμεκτίν+ Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ + Χλωραντρανιλιπρόλ, Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ -14 μέρες }, {Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Νεκταρινιά: {Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν Μπενζοείτ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπινοςάντ -7 μέρες }, {Ιντοξακάρμπ - 10 μέρες}, {Αμπαμεκτίν+Χλωραντρανιλιπρόλ, Θιαμεθοξάμ + Χλωραντρανιλιπρόλ, , Φοσμέτ, Χλωραντρανιλιπρόλ-14 μέρες}, {Χλωρπυριφός μεθύλ 21 μέρες}.

Δαμασκηνιά: Βάκιλλος Θουριγγίας (βιολογικό σκεύασμα), {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ- 7μέρες}, {Χλωραντρανιλιπρόλ -14μέρες}, {Χλωρπυριφός -21 μέρες }.

2 .ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα και εφόσον ο καρπός είναι σε στάδιο προσβολής από το έντομο, πρέπει να είναι προστατευμένος.

Οδηγίες: Ο καρπός μπορεί να προσβληθεί από το έντομο στο σπάσιμο του χρώματος. Να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολών.

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

{*Bauveria basiana strain atcc 74040* 0 μέρες επέμβαση όταν τα έντομα είναι δραστήρια όχι πρωινές και απογευματινές ώρες}, {Δελταμεθρίν, Λάμντα Συαλοθρίν 7 μέρες }, Παγίδες Δελταμεθρίν, {Φοσμέτ μόνο σε ροδακινιά , νεκταρινιά 14 μέρες}.

3.ΛΕΚΑΝΙΟ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ (*Parthenolecanium corni*)

Πρόκειται για κοκκοειδές που προσβάλλει φυλλοβόλα καρποφόρα δένδρα όπως τα πυρηνόκαρπα, καθώς και καλλωπιστικά. Οι προνύμφες του ανάλογα με την εποχή και το μέρος του δένδρου που προσβάλλουν, έχουν χρώμα κιτρινοπράσινο όταν είναι στα φύλλα μέχρι κιτρινο και καφέ πάνω στα κλαδιά. Έχει μια γενιά το έτος.

Διαπιστώσεις: Έχει εμφανιστεί στην περιοχή του Κουτσοποδίου της ΠΕ Αργολίδας σε εντοπισμένη προσβολή. Οι εκκολάψεις πλησιάζουν το 90-95%.

Οδηγίες: Ελέγξτε τους οπωρώνες των ανωτέρω πυρηνοκάρπων με προσοχή. Δένδρα με κόλλα στην νεαρή βλάστηση ενώ δεν υπάρχει προσβολή από αφίδες, είναι ύποπτα για την ύπαρξη του κοκκοειδούς η οποία αφού διαπιστωθεί πρέπει να επέμβετε άμεσα.

Εάν η συγκομιδή γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 ημερών τότε η επέμβαση να γίνει αμέσως μετά την συγκομιδή. Μπορείτε να προσκομίζετε δείγματα στην υπηρεσία μας.

Φυτ/κά προϊόντα:

{Θερινά λάδια, Σπιροτετραμάτ -21 μέρες}.

4. ΜΟΝΙΛΙΑ- ΚΟΡΥΝΕΟ

Διαπιστώσεις Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στους καρπούς. Τα δένδρα καλό είναι να προστατευθούν άμεσα με μυκητοκτόνο.

Οδηγίες :

Φυτ/κά προϊόντα :

1. Βερικοκιά: {Βιολογικό σκεύασμα με *Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 -0 μέρες*}, {Θειοφανείτ-μεθύλ, Ιπροντιόν, Φενμπουκοναζόλ - 3 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+ Τεμπουκοναζόλ, Τεμπουκοναζόλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Φλουοπιυράμ+Τεμπουκοναζόλ - 7 μέρες}, {Προπικοναζόλ -14 μέρες}.

2. Ροδακινιά: {Βιολογικό σκεύασμα με *Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 -0 μέρες*}, {Φενπυραζαμίν -1 μέρα}, {Θειοφανείτ-μεθύλ, Ιπροντιόν, Φλουοπιυράμ+ Τεμπουκοναζόλ, Φεμπουκοναζόλ - 3 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ, Συπροντινίλ+ Τεμπουκοναζόλ - 7 μέρες} {Προπικοναζόλ 14 μέρες},

3. Νεκταρινιά: {Βιολογικό σκεύασμα με *Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 -0 μέρες*}, {Φενπυραζαμίν -1 μέρα}, {Θειοφανείτ-μεθύλ, Ιπροντιόν, Φλουοπιυράμ+ Τεμπουκοναζόλ, Φεμπουκοναζόλ,- 3 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ, Συπροντινίλ+ Τεμπουκοναζόλ -7 μέρες}, {Προπικοναζόλ - 14 μέρες}

4. Δαμασκηνιά: {Βιολογικό σκεύασμα με *Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 -0 μέρες*}, {Ιπροντιόν, Φεμπουκοναζόλ -3 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συπροντινίλ, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ, Τεμπουκοναζόλ -7 μέρες} {Θειοφανείτ -μεθύλ- 14 μέρες}

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι μέρες που αναγράφονται δίπλα στις δραστικές ουσίες, είναι οι μέρες που μεσολαβούν από την τελευταία επέμβαση ως την συγκομιδή. Να δοθεί μεγάλη προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που θα χρησιμοποιηθεί . ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

1. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ